

## Cetacodeine Extra (TABLETS)



### COMPOSITION:

Each tablet contains:

Paracetamol USP	500 mg.
Codeine phosphate BP	10 mg.
Caffeine anhydrous BP	30 mg.

### MECHANISM OF ACTION & PHARMACOLOGICAL PROPERTIES:

Paracetamol & codeine combine the central analgesic action of codeine-on the CNS and the peripheral analgesic, antipyretic action of paracetamol, also caffeine has a stimulating action on the CNS.

All these active ingredients are well absorbed orally.

Paracetamol acts through inhibiting prostaglandin synthesis in the CNS and that explains its analgesic and antipyretic properties.

Codeine administered orally exhibits an effective analgesic effect.

The antitussive action is reached in smaller doses.

Caffeine is a methylxanthine derived and acts on the CNS, increasing the physical and mental activity (through stimulating brain cortex).

### INDICATIONS:

CETACODEINE EXTRA is a special formulation for strong fast pain relief suitable for migraine, headache, rheumatic pain, toothache, neuralgia influenza, pharyngitis, neuropathy and fever.

### CONTRAINDICATIONS:

Hypersensitivity to one of the components and patients with impaired hepatic function. It is contraindicated in pregnant woman.

### SIDE EFFECTS:

Drowsiness, sleepiness, sedation, sweating, vomiting, nausea, anorexia, and constipation.

### DRUG INTERACTIONS:

It should be used with care following medicaments:

- Narcotics.
- CNS inhibitors (including alcohol); hypnotics, tranquilizers, antihistamines.
- Anticholinergics.

### WARNINGS:

- Avoid driving a motor vehicle or operating machinery when taking this drug.
- Taking this drug for long time, and in large amounts may induce habituation.

– It should be taken with care in patients with impaired renal functions.

### DOSAGE & ADMINISTRATION:

Adults & children over 12 years: 1–2 tablets 3–4 times daily.

### OVERDOSAGE:

In massive over dosage it may cause liver damage especially in elderly.

### PRESENTATION:

Box of 30 tablets.

PK0269/01

TPP1301464	THIS IS A MEDICAMENT
	<ul style="list-style-type: none"><li>– A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.</li><li>– Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.</li><li>– The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.</li><li>– Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.</li><li>– Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.</li><li>– Keep medicaments out of reach of children.</li></ul> <p>(Council of Arab Health Ministers &amp; Arab Pharmacists Association)</p>

Ultra Medica Pharmaceutical Industries: Sydnaia – Damascus – Syria  
Tel.: +963 11 5955339 – Fax: +963 11 5975174  
E-mail: ultramed@scs-net.org – www.ultra-medica.net



(مضغوطات)

## سيتاكودين إكسترا

### التركيب:

باراسيتامول	٥٠٠ ملغ.
كافئين لامائي	٣٠ ملغ.
كودئين فوسفات	١٠ ملغ.

### آلية التأثير والتأثيرات الدوائية:

إن الباراسيتامول والكودئين تجمعان التأثير المركزي المسكن للألم للكودئين والتأثير المحيطي المسكن للألم والخافض للحرارة للباراسيتامول.

كما أن للكافئين تأثير مؤازر في تسكين الألم. وكل هذه المركبات جيدة الامتصاص عن طريق الفم. يؤثر الباراسيتامول عن طريق تثبيط تركيب البروستاغلاندين وهذا يشرح خواصه الخافضة للحرارة والمسكنة للألم. الكودئين ذو فعالية عالية مسكنة للألم ويظهر أيضاً فعالية جيدة مضادة للسعال في الجرعات التي لا تسبب فعلاً مسكناً.

أما الكافئين فهو من زمرة الميثيل اكراتينات وتأثيره على الجملة العصبية المركزية يؤدي إلى النشاط الفيزيائي وزيادة التنبيه العقلي كنتيجة لتثبيته القشر والمناطق الأخرى من الدماغ.

### الاستجابات:

إن مستحضر سيتاكودين إكسترا ذو تركيبة خاصة لمعالجة الآلام الشديدة والمتوسطة وللمعالجة آلام الشقيقة، الصداع، آلام الرية، عسر الطمث، آلام الأسنان، أعراض الرشح والانفلونزا، التهاب البلعوم والحرارة، آلام الأعصاب.

### مضادات الاستجاب:

– يجب أن لا يستعمل هذا المركب للأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه أحد مركباته أو المصابين بقصور كبدى.

– لا يعطى للحوامل.

### التأثيرات الجانبية:

تأثيراته الجانبية نادرة ولكن قد يسبب سيتاكودين إكسترا الإحساس بالتعاس، دوار، تهدة، تعرق، وغثيان، إقياء، اسماك، فقدان شهية.

### التداخلات الدوائية:

يجب الحذر عند استعمال سيتاكودين إكسترا مع الأدوية التالية:

– مسكنات الآلام المركزية.

– مثبطات الجملة العصبية (بما فيها الكحول) مثل: الأدوية المنومة، المهدئات، مضادات الهستامين، مضادات الشنج.

### التحذيرات:

أخذ الحذر عن قيادة السيارات والعمل على الآلات.

أخذ الدواء لفترات طويلة وبكميات كبيرة قد يؤدي إلى الاعتياد على الدواء.

أخذ الحذر عند إعطائه لمرضى القصور الكلوي.

### الجرعة وطريقة الاستعمال:

البالغين والأطفال فوق ١٢ سنة: (١-٢) مضغطة (٤-٤) مرات يومياً.

أما الجرعات العالية فإنه يمكن أن يظهر بأذية كبدية وخاصة لدى الكهول.

### العبوة:

٣٠ مضغطة (٣ ظروف من البليستر) في عبوة كروتونية.

PK0269/01

TPP1301464	إن هذا دواء
	<ul style="list-style-type: none"><li>– الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.</li><li>– اتبع بدقة وصفة الطبيب، وطريقة الاستعمال الموصى عليها، وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.</li><li>– إن الطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء ونفعه وضرره.</li><li>– لا تتقطع صرفة العلاج المحدد من تلقاء نفسك.</li><li>– لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.</li><li>– احفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.</li></ul> <p>(تعليمات مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيدلة العرب)</p>

التراميديكا للصناعات الدوائية: صيدنايا – دمشق – سورية  
هاتف: ٠٩٦٣ ١١ ٥٩٥٥٣٣٩ – فاكس: ٠٩٦٣ ١١ ٥٩٧٥١٧٤  
www.ultra-medica.net – ultramed@scs-net.org  
بريد الكتروني: