

– ULTRA-MEDICA/LEAF/Ultraglycerol 70% 1,2,4 g (Size: 98 x 160 mm)
– E6.5.2013/Sab6.5/T26/T1.6/

ULTRAGLYCEROL 70% (1,2,4 g) (SUPPOSITORIES)



COMPOSITION:

Ultraglycerol for adult and child over 12 years:
Each suppository 4 g contains: glycerine 70% w/w.
Ultraglycerol for child 1-12 years:
Each suppository 2 g contains: glycerine 70% w/w.
Ultraglycerol for infant under 1 year:
Each suppository 1g contains: glycerine 70% w/w.

PROPERTIES & MECHANISM OF ACTION:

Glycerol classified as laxative and administered rectally suppositories to promote faecal evacuation, it attracts water into stools and softens inspissated faecal mass (it usually acts within 15-30 minutes) possibly due to the hygroscopic effect of osmotic effects of glycerol drawing water into the faecal promoting rectal contraction glycerol may be additionally or alternatively through its local irritant effect it may be also have lubrication and faecal softening.

INDICATIONS:

Glycerol is used in treatment of constipation and for bowel evacuation before investigational procedures such as endoscopy of radiological or before surgery, postoperative care and in preparation for natural delivery.

CONTRAINDICATIONS:

Acute surgical abdominal, appendicitis, intestinal obstruction, rectal bleeding and acute gastroenteritis.

SIDE EFFECTS:

Skin pruritus around anal area, and intestinal cramps.

PRECAUTIONS:

Use this product may interfere with glucose control in diabetic patients. Best avoided during the first trimester of pregnancy.

DRUG INTERACTIONS:

It should be given cautiously with:
1. Diuretics, 2. Potassium sparing medicines, 3. Mineral oil

DOSE & ADMINISTRATION:

Adults: 1-2 suppositories adult size as needed.

Children: 1 suppository pediatric size as needed.

NOTE: suppository moistened with water to be inserted into rectum as required. Patients should be retaining suppository into rectum as long as possible before excretion.

PACKAGE:

Ultraglycerol for adult and child over 12 years: 10 suppositories in two blisters packed in carton box.

Ultraglycerol for child 1-12 years: 10 suppositories in two blisters packed in carton box.

Ultraglycerol for infant under 1 year: 10 suppositories in two blisters packed in carton box.

STORAGE: Store below 25°C. Keep away from children.

PK0703/01

TPP1301484	THIS IS A MEDICAMENT
– A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to its use as a food product. – Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament. – Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you. – Do not repeat the same prescription without consulting your doctor. – Keep your medicine in its original packaging. (Council of Arab Health Ministers & Arab Pharmacists Association)	

Ultra Medica Pharmaceutical Industries: Syria
Tel.: +963 11 5955339 – Fax: +963 11 5975174
E-mail: ultramed@scs-net.org – www.ultra-medica.net



التراغليسيرول ٧٠% (٤,٢,١ غرام) (تحامل شرعية)

التكوين،
التراغليسيرول للبالغين والأكثر من ١٢ سنة: كل تحميلة ٤ غرام تحوي غليسيرين ٧٠٪ و/و.
التراغليسيرول للأطفال بعمر ١-١٢ سنة: كل تحميلة ٢ غرام تحوي غليسيرين ٧٠٪ و/و.
التراغليسيرول للرضع بعمر أقل من سنة: كل تحميلة ١ غرام تحوي غليسيرين ٧٠٪ و/و.

الخصائص واليئة التطبيقية،
يصفى التراغليسيرول كحليين ويعطى على شكل تحميلة شرعية لتفريغ البراز. يذوب المله إلى داخل الكنتة البرازية فيقضي الكنتة البرازية الكثيفة (يؤثر خلال ١٥ - ٣٠ دقيقة)، ويمكن أن يترى ذلك إلى تأثير الغليسيرول الحلو المالح للماء إلى داخل الكنتة البرازية معوضاً على انقباض المستقيم، ويمكن أن يؤثر أيضاً من خلال التفريش الموضعي أو عن طريق ترقيق الكنتة البرازية وتطريتها.

الاستخدامات،
يستخدم التراغليسيرول لعلاج الإمساك، وتفرغ الأمعاء قبل التنظير الشفاهي أو العمل الجراحي، كما يستخدم في العناية قبل الولادة وبعدها وفي التحضير للولادة الطبيعية.

مضادات الاستطباب،
الطن الجراحي الحاد، التهاب الزائدة البرودية، انسداد الأمعاء، التيف المستقيمي، التهاب الأمعاء والمعدة الحاد.

التأثيرات الجانبية،
حكة بسيطة بالمنطقة المحيطة بالشرج وبعض عوي.

التحذيرات،
استعمال المستحضر قد يتناثر مع ضبط الغلوكرز لدى مرضى السكري. يفضل أن لا يعطى أثناء الفترة الأولى من الحمل.

التفاعلات الدوائية،
يعطى بخدر مع الأدوية التالية:

المدرات البرازية، موصات البروتاسيوم، الزيوت المعدنية (زيت البرافين).

الجرعة وطريقة الاستعمال،
للأطفال: تحميلة واحدة أو تحميلتان عند الحاجة.

للأطفال: تحميلة واحدة عند الحاجة.

ملاحظة: يمكن أن توجب التحميلة بناءً قبل الاستخدام وعلى المريض أن يحتفظ بالتحميلة داخل المستقيم.

العبوة،
أطول فترة مستكة قبل الأوان.

العنوان،
التراغليسيرول (٤ غرام) للبالغين والأكثر من ١٢ سنة: ١٠ تحميلة في شريطين من البلاستر ضمن عبوة كرتونية مع شفرة.

التراغليسيرول (٢ غرام) للأطفال بعمر ١-١٢ سنة: ١٠ تحميلة في شريطين من البلاستر ضمن عبوة كرتونية مع شفرة.

التراغليسيرول (١ غرام) للرضع بعمر أقل من سنة: ١٠ تحميلة في شريطين من البلاستر ضمن عبوة كرتونية مع شفرة.

الاحتياطات،
يحفظ بدرجة حرارة أقل من ٢٥م بعيداً عن متناول الأطفال.

PK0703/01

TPP1301484	ان هسة نواه
- الماء مستحضر يؤخذ على صحتك واستهلاكه خلال التحميلات يحرمك من الماء. - في حالة عدم التحميلة أو عدم التحميلة، يجب عليك استشارة الطبيب. - إن الطبيب والصيداني هما الذين يحددان الجرعة والوقت وتكرار التحميلة. - لا تلتصق صفة العلاج المصنعة من الماء بفسك. - لا تلتصق صفة العلاج المصنعة من الماء بفسك. - لا تلتصق صفة العلاج المصنعة من الماء بفسك. - تحميلة واحدة عند الحاجة. - تحميلة واحدة عند الحاجة. - تحميلة واحدة عند الحاجة.	

التراغليسيرول للصناعات الدوائية: صيدانيا - دمشق - سورية
هاتف: +963 11 5955339 - فاكس: +963 11 5975174
www.ultra-medica.net - ultramed@scs-net.org
بريد الكتروني: ultramed@scs-net.org

المواصفة
3/6/15