

## TUSSI-FREE

(SYRUP)



### COMPOSITION:

Each 5 ml syrup contains:  
Dextromethorphan HBr 10 mg  
Pseudoephedrine HCL 30 mg  
Guaifenesin 100 mg

### CHARACTERISTICS:

TUSSI-FREE is well produced to treat cough accompanied upper and lower respiratory tracts infections, it contains, dextromethorphan HBr which has central antitussive effect, pseudoephedrine HCL Which has decongestant and bronchial dilator effect, guaifenesin which has the expectorant effect.

### INDICATIONS:

Cough and congestion accompanied upper and respiratory tracts infections, flu, allergic cough.

### CONTRAINDICATION:

Hypersensitivity to any component, severe hypertension or cardiovascular disease, nursing mother.

### WARNING:

Diabetes, hypertension, prostate hypertrophy, asthma, chronic cough cases, chronic bronchitis, cough accompanied with heavy secretions, hyperthyroidism, elderly, glaucoma, GI or urinary obstruction, pregnancy.

If cough continues for more than 7 days or get worsen, or accompanied with fever or rash seek medical advise.

### DRUG INTERACTION:

Hypertensive crisis with B blockers, MAOI's antagonist anti-Hypertensive drug. This product should not be concomitantly administered with narcotic, analgesic, sedative, alcohol, central nervous system depressant.

### SIDE EFFECTS:

Tachycardia, arrhythmia, headache, dizziness, hypertension, anxiety, insomnia, GI upset.

### DOSAGE:

Adults: Take two tablespoonfuls every 6 hours or as directed by doctor.

Children 12 years of age and older: Take two tablespoonfuls every 6 hours or as directed by doctor.

For children under 12 years of age: To be used as directed by physician only.

### PACKAGE:

Glass bottle 125 ml.

PK0320/01

TPP1301573	THIS IS A MEDICAMENT
-	A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
-	Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.
-	The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
-	Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
-	Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
-	Keep medicaments out of reach of children.

(Council of Arab Health Ministers & Arab Pharmacists Association)

Ultra Medica Pharmaceutical Industries: Sydnaia – Damascus – Syria

Tel.: +963 11 5955339 – Fax: +963 11 5975174

E-mail: ultramed@scs-net.org – www.ultra-medica.net



(شرباب)

## توسي فري

### التركيب:

كل ٥ مل شرباب تحتوي على:

ديكستروميثورفان هيدروبروميد ١٠ ملغ  
بسودوافدرين هيدروكلوريد ٣٠ ملغ  
غوايفينيزين ١٠٠ ملغ

### خواص المستحضر:

يحتوي هذا المستحضر على تركيبة ثلاثية مناسبة وفعالة بحيث أنه يتميز في علاج حالات السعال المرافقة لالتهاب الطرق التنفسية العلوية والسفلية وذلك من خلال وجود مادة الديكستروميثورفان هيدروبروميد المشطة للسعال بآلية مركزية ووجود مادة السودوافدرين هيدروكلوريد المضادة للاحتقان في الأغشية المخاطية والموسعة للقصبات وكذلك وجود مادة الغوايفينيزين ذات التأثير المقشع للطرق التنفسية مما يجعل هذا الدواء فعالاً في علاج حالات السعال والاحتقان.

### الاستطباب:

يستعمل هذا الدواء لعلاج حالات السعال والاحتقان المرافقة لالتهاب الطرق التنفسية العلوية (التهاب البلعوم، التهاب اللوزات، التهاب الحنجرة، التهاب الأذن الوسطى)، الأنفلونزا، السعال التحسسي.

### مضادات الاستطباب:

فرط التحسس لأي من مكونات هذا المستحضر، المرضع، وجود مرض قلبي شديد أو وجود ارتفاع ضغط غير معالج.

### التحذيرات:

يستعمل هذا المستحضر بحذر في حالات السكري، ارتفاع الضغط، ضخامة البروستات، الربو، حالات السعال المزمن، التهاب القصبات المزمن، السعال المترافق مع قشع غزير، فرط نشاط الدرق، الكحول، وجود ارتفاع في ضغط العين، انسداد في الطرق الهضمية أو البولية، الحمل.

إذا استمر السعال لأكثر من ٧ أيام أو ترافق بالحمى أو الطفح، راجع الطبيب فوراً.

### التداخلات:

حدوث نوبات من ارتفاع الضغط لدى استعماله مع حاصرات بيتا، مثبطات مونو أمينو أوكسيداز، يعاكس هذا المستحضر تأثير الأدوية الخافضة للضغط.

يجب عدم المشاركة مع المهدئات والمسكنات والكحول ومثبطات الجملة العصبية المركزية.

### التأثيرات الجانبية:

قد تحدث في بعض الحالات تسرع في القلب، اضطراب بالنظم، ارتفاع في ضغط الدم بشكل خفيف، صداع، دوار، أرق، قلق، اضطراب هضمي.

### الجرعة:

للبالغين: ملعقتان كل ٦ ساعات أو حسب توصيات الطبيب.

للأطفال فوق ١٢ سنة: ملعقتان كل ٦ ساعات أو حسب توصيات الطبيب.

للأطفال تحت ١٢ سنة: لا يعطى إلا حسب رأي الطبيب.

### العبوة:

عبوة زجاجية سعة ١٢٥ مل.

PK0320/01

TPP1301573	إن هذا دواء
-	الدواء مستحضر يؤثر على صحتك، واستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.
-	اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المخصوص عليها، وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
-	إن الطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء ونفعه وضرره.
-	لا تقطع مدة العلاج المحددة من تلقاء نفسك.
-	لا تتركز صرف الدواء بدون وصفة طبية.
-	احفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.

(تعليمات مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيدلاني العرب)

التراميديكا للصناعات الدوائية: صيدنايا – دمشق – سورية

هاتف: +963 11 5955339 – فاكس: +963 11 5975174

بريد الكتروني: ultramed@scs-net.org – www.ultra-medica.net